

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
CLAVASEPTIN® 250 mg



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

I. Denominación de Producto Farmacológico											
a. Nombre de Fantasía	CLAVASEPTIN® 250 mg										
b. Nombre Genérico	Amoxicilina 200 mg, Ácido clavulánico 50 mg										
c. Forma farmacéutica	Comprimido oral masticable										
II. N° Reg. SAG											
	2430-B										
III. Composición											
	Amoxicilina trihidrato.....229,61 mg (Equivalente a Amoxicilina)200,00 mg Clavulanato de potasio.....60,47 mg (Equivalente a Ácido clavulánico).....50,00 mg mg Excipientes c.s.p.....1 comprimido										
IV. Particularidades clínicas											
a. Especies de destino	Perros.										
b. Indicaciones de uso	En perros: Tratamiento o tratamiento coadyuvante de las infecciones periodontales causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina en combinación con ácido clavulánico, es decir: <i>Pasteurella spp</i> , <i>Streptococcus spp</i> y <i>Escherichia coli</i> .										
c. Dosis, vías de administración y modo de empleo.	La dosis del producto es 10 mg de amoxicilina / 2,5 mg ácido clavulánico por kg de peso corporal dos veces al día por vía oral en perros. 1 comprimido por 20 kg de peso corporal cada 12 h, de acuerdo con la siguiente tabla: <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Peso corporal (Kg)</th> <th style="padding: 5px;">Clavaseptin® 250 mg Número de comprimidos dos veces al día</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">8,1 – 10</td> <td style="padding: 5px;">½</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">10,1 – 20</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">20,1 – 30</td> <td style="padding: 5px;">1 ½</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">30,1 - 40</td> <td style="padding: 5px;">2</td> </tr> </tbody> </table>	Peso corporal (Kg)	Clavaseptin® 250 mg Número de comprimidos dos veces al día	8,1 – 10	½	10,1 – 20	1	20,1 – 30	1 ½	30,1 - 40	2
Peso corporal (Kg)	Clavaseptin® 250 mg Número de comprimidos dos veces al día										
8,1 – 10	½										
10,1 – 20	1										
20,1 – 30	1 ½										
30,1 - 40	2										

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
CLAVASEPTIN® 250 mg



	<p>No administrar en perros con pesos inferiores a 8 kilogramos. En infecciones graves la dosis puede duplicarse a 20 mg de amoxicilina /5 mg ácido clavulánico por kg de peso corporal dos veces al día.</p> <p>Vía de administración: Vía oral</p> <p>Duración del tratamiento: - 7 días para el tratamiento de las infecciones periodontales en perros.</p> <p>El estado clínico de los animales debe ser reevaluado después de 7 días y el tratamiento prolongado durante 7 días más, si es necesario. Los casos graves de infección de la piel pueden requerir una duración incluso de más tiempo de tratamiento y esto debe ser a criterio del veterinario responsable.</p> <p>Para garantizar la correcta dosificación, el peso corporal se debe determinar con la mayor precisión posible para evitar infradosificación.</p>
d. Contraindicaciones	<p>No usar en animales con hipersensibilidad conocida a las penicilinas u otras sustancias del grupo β-lactámicos. No usar en casos de resistencia conocida a la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico. No usar en animales con disfunción renal grave acompañados de anuria u oliguria. No administrar en gerbos, conejillos de indias, hámsters, conejos y chinchillas. No administrar a caballos y animales rumiantes.</p>
e. Efectos adversos y reacciones adversas	<p>Pueden observarse vómitos y diarrea. El tratamiento puede interrumpirse dependiendo de la gravedad de los efectos adversos y la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario. Pueden observarse reacciones de hipersensibilidad (reacciones cutáneas alérgicas, anafilaxis). En estos casos, la administración debe interrumpirse y evaluar un tratamiento sintomático.</p>
f. Advertencias y precauciones especiales de uso	<p>Además de la sección relativa a las contraindicaciones: En los animales con alteración de la función hepática y renal, el uso del producto debe ser objeto de una evaluación del riesgo/beneficio por el veterinario y evaluar la posología cuidadosamente. El uso del producto debe basarse en pruebas de sensibilidad bacteriana. El uso inadecuado del producto puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a amoxicilina / ácido clavulánico. El uso del producto debe tener en cuenta las políticas antimicrobianas locales. Mantener fuera del alcance de los niños</p>

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
CLAVASEPTIN® 250 mg



g. Uso durante preñez, lactancia, postura y animales reproductores	No administrar en hembras gestantes ni en lactancia.
h. Interacción con otros productos farmacéuticos.	La actividad bactericida de la amoxicilina puede verse reducida por el uso simultáneo de sustancias bacteriostáticas como macrólidos, tetraciclinas, sulfonamidas y cloranfenicol. Debe considerarse la posibilidad de reacciones alérgicas cruzadas con otras penicilinas. Las penicilinas pueden incrementar el efecto de los aminoglucósidos.
i. Sobredosis	A dosis tres veces superiores a las recomendadas administradas durante 28 días, se observaron diarreas en perros. En el caso de sobredosis se recomienda un tratamiento sintomático.
j. Periodo de resguardo	No aplica
k. Precauciones especiales para el operador	Las penicilinas y cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia) después de la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. Hipersensibilidad a las penicilinas puede dar lugar a reacciones cruzadas a las cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente graves. 1. No manipular este producto si sabe que es sensible, o si se le ha aconsejado que no trabaje con estas preparaciones. 2. Manipular este producto con mucho cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones recomendadas. 3. Si se presentan síntomas después de la exposición, tales como erupciones en la piel, se debe consultar a un médico y mostrar esta advertencia. La hinchazón de la cara, labios u ojos o dificultad para respirar son síntomas más graves y requieren atención médica urgente. Lávese las manos después de manipular los comprimidos.
V. Particularidades farmacéuticas	
a. Principales incompatibilidades físicas o químicas con otros productos	Ninguna conocida.

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
CLAVASEPTIN® 250 mg



<p>b. Periodo de eficacia</p>	<p>Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 36 meses. En caso de partir el comprimido, la mitad sobrante debe ser utilizada antes de 16 horas.</p>						
<p>c. Condiciones de almacenamiento</p>	<p>Mantener a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C, en ambiente fresco y en su envase original.</p>						
<p>d. Descripción de envases</p>	<p>Cajas tipo estuche de cartón impreso conteniendo 1 o 2 blíster de aluminio impreso de 10 comprimidos cada uno, incluye inserto.</p>						
<p>e. Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o material de desecho</p>	<p>Eliminar envases vacíos junto con los desechos domésticos. Producto vencido o restos del mismo, en lo posible, a través de una empresa especializada en la eliminación de este tipo de residuos.</p>						
<p>VI. Propiedades Farmacológicas</p>	<p>La amoxicilina es un bencilpenicilina amino de la familia de las penicilinas β-lactama que impide la formación de la pared celular bacteriana interfiriendo con la etapa final de la síntesis del peptidoglicano.</p> <p>El ácido clavulánico es un inhibidor irreversible de β-lactamasas intracelulares y extracelulares que protege la amoxicilina de la inactivación por muchos β-lactamasas.</p> <p>Amoxicilina / ácido clavulánico tienen una amplia gama de actividades que incluye cepas β-lactamasas productoras de ambos aerobios Gram-positivas y Gram-negativas, anaerobios facultativos y anaerobios obligados.</p> <p>Puntos de corte amoxicilina / ácido clavulánico (Comité Nacional de Normas de Laboratorio Clínico / 2002): <i>Staphylococci</i>: sensible: MIC \leq 2/4 μg/ml, resistente: MIC \leq 4/8 μg/ml Otros organismos: sensibles: MIC \leq 4/8 μg/ml, resistente: MIC \leq 32/16 μg/ml</p> <p>En infecciones periodontales en perros en Europa (aislados del año 2002 de Francia, Alemania y Bélgica) la combinación amoxicilina / ácido clavulánico en una proporción 2/1 mostró los siguientes datos sobre la sensibilidad:</p> <table data-bbox="688 1682 1338 1776"> <tr> <td><i>Pasteurellaceae</i>:</td> <td>MIC90: 0,4/0,2 μg/ml,</td> </tr> <tr> <td><i>Streptococcus spp</i>:</td> <td>MIC90: 0,4/0,2 μg/ml,</td> </tr> <tr> <td><i>Escherichia coli</i>:</td> <td>MIC90: 5,3/2,6 μg/ml,</td> </tr> </table>	<i>Pasteurellaceae</i> :	MIC90: 0,4/0,2 μ g/ml,	<i>Streptococcus spp</i> :	MIC90: 0,4/0,2 μ g/ml,	<i>Escherichia coli</i> :	MIC90: 5,3/2,6 μ g/ml,
<i>Pasteurellaceae</i> :	MIC90: 0,4/0,2 μ g/ml,						
<i>Streptococcus spp</i> :	MIC90: 0,4/0,2 μ g/ml,						
<i>Escherichia coli</i> :	MIC90: 5,3/2,6 μ g/ml,						

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
CLAVASEPTIN® 250 mg



	<p><i>Enterobacteriaceae</i>: MIC90: 22,6/11,3 µg/ml, excepto para <i>Enterobacter spp</i> <i>Pseudomonadaceae</i>: MIC90: 147,0/73,5 µg/ml, <i>Enterobacter spp</i>: MIC90: 49,6/24,8 µg/ml,</p> <p>Las resistencias aparecen fundamentalmente en <i>Pseudomonadaceae</i> (81,25%) y en <i>Enterobacter spp</i> (55,5%).</p> <p>La resistencia a antibióticos β-lactámicos está mediada principalmente por β-lactamasas que hidrolizan antibióticos como la amoxicilina.</p> <p>Patrones de susceptibilidad y resistencia pueden variar en función de la zona geográfica y la cepa bacteriana, y pueden cambiar con el tiempo.</p>
VII. Propiedades Farmacocinéticas	<p>Después de la administración oral de la dosis recomendada en perros y gatos, la absorción de la amoxicilina y el ácido clavulánico es rápida. En perros, la concentración máxima de amoxicilina de 8,5 µg/ml en plasma se alcanza en 1,4 h y la concentración máxima de ácido clavulánico de 0,9 µg/ml en plasma se alcanza en 0,9 h. La vida media es de 1 hora en perros para ambas sustancias. La eliminación también es rápida. 12% de la amoxicilina y 17% de ácido clavulánico se excretan en la orina. El resto se excreta en forma de metabolitos inactivos.</p> <p>Después de la administración oral repetida de la dosis recomendada en perros y gatos, no hay acumulación de amoxicilina o ácido clavulánico y el estado estacionario se alcanza rápidamente después de la primera administración.</p>
VIII. Efectos Ambientales	<p>Clavaseptin® se utiliza como tratamiento individual, en condiciones específicas. Por lo tanto, puede deducirse que Clavaseptin® no tendrá impacto ambiental significativo.</p>
IX. Condición de venta	<p>Venta bajo Receta Médico Veterinaria Prohibida su venta fraccionada</p>
X. Nombre y dirección laboratorio fabricante y Titular de comercialización	
a. Fabricante	<p>Laboratorio fabricante: Vetoquinol S.A Magny Vernois F-70200 Lure, Francia.</p>

FICHA TÉCNICA

Revisión: 3
Fecha Revisión: 11-03-2019

PRODUCTO:
CLAVASEPTIN® 250 mg



b. Titular de comercialización

Establecimiento importador y distribuidor: Chemie S.A. San Ignacio 401-B, Parque industrial Buenaventura, Quilicura, Santiago – Chile, bajo licencia de Vetoquinol S.A, Francia.