

DIARREPAS® Suspensión Oral

ANTIDIARREICO Y QUIMIOTERÁPICO.



Se recomienda su uso en infecciones intestinales provocadas por organismos sensibles a Sulfonamidas no absorbibles. Indicado para el tratamiento de infecciones entéricas provocadas por organismos gram positivos y gram negativos. Uso terapéutico en cuadros diarreicos agudos o crónicos de perros y gatos, ya que posee quimioterápicos protectores de mucosa, que evitan la injuria en el epitelio intestinal provocada por sustancias irritantes. Por la presencia de adsorbentes intestinales, también evita la absorción de toxinas, gases, u otras sustancias tóxicas de origen orgánico o inorgánico, que puedan complicar un cuadro diarreico.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antidiarreico y quimioterápico.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Ftalilsulfatiazol10 g
Sulfaguanidina.....10 g

Caolín coloidal.....20 g
Pectina cítrica.....1 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES

Se recomienda su uso en infecciones intestinales provocadas por organismos sensibles a Sulfonamidas no absorbibles. Indicado para el tratamiento de infecciones entéricas provocadas por organismos gram positivos y gram negativos. Uso terapéutico en cuadros diarreicos agudos o crónicos de perros y gatos, ya que posee quimioterápicos protectores de mucosa, que evitan la injuria en el epitelio intestinal provocada por sustancias irritantes. Por la presencia de adsorbentes intestinales, también evita la absorción de toxinas, gases, u otras sustancias tóxicas de origen orgánico o inorgánico, que puedan complicar un cuadro diarreico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

- **Dosis de los principios activos:** Ftalilsulfatiazol 100 mg/Kg; Sulfaguanidina 100 mg/Kg; Caolín Coloidal 200 mg/Kg, Pectina Cítrica 10 mg/Kg, cada 12 horas por 4 días.
- **Dosis del producto:** 10 mL por cada 10 kilos de peso, cada 12 horas por 4 días.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en forma simultánea o asociada a otros quimioterápicos, u otras sustancias con acción similar.
- No administrar en animales que presenten resistencia al tratamiento con Sulfonamidas.
- No se debe administrar en animales que presenten antecedentes de hipersensibilidad a algunos de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática.
- Usar con precaución en estados de preñez avanzada.

OBSERVACIONES

Agitar antes de usar.

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material

de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua natural. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura entre 15 y 30°C, protegido de la luz. Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 7 días. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 133

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario