

Ficha técnica – Ohm

DESCRIPCIÓN

Biomodulador de la ansiedad de administración oral en comprimidos palatables.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 3 blisters de 7 comprimidos cada uno.

ACCIÓN

Suplemento dietario modulador de la ansiedad, indicado en aquellas ocasiones en las que el comportamiento del animal se vea afectado por situaciones de estrés o miedo. El triptófano induce un aumento en los niveles de serotonina, de esta forma colabora disminuyendo la ansiedad y agresividad en forma natural. La valeriana es un relajante natural compuesto por agentes sedantes que actúan sobre el sistema nervioso, colaborando en el tratamiento de la ansiedad.

INDICACIONES

Indicado para situaciones que generen un aumento en los niveles de estrés y ansiedad tales como:

- Viajes
- Entornos ruidosos
- Manejo de animales indóciles en el consultorio
- Post-operatorios
- Estrés por separación
- Mudanzas
- Llegada de un nuevo habitante al hogar
- Cambios en el estilo de vida
- Estadías en pensionados

FÓRMULA

Cada comprimido de 1500 mg. contiene:

Triptófano 200 mg.

Extracto de Valeriana 100 mg.

Excipientes c.s

POSOLÓGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Gatos o perros de 5 kilos o menos: ½ comprimido.

Perros de 5 a 10 kilos: 1 comprimido.

Perros de más de 10 kilos: 2 comprimidos.

En casos de animales resistentes a recibir medicación por vía oral, el comprimido puede molerse hasta obtener un polvo, que puede mezclarse en la comida. Una vez por día.

Para eventos puntuales: Iniciar la administración por lo menos 2 a 5 días antes del evento planificado o cambio de ambiente. Algunos animales pueden requerir una administración previa (6-10 días).

Como modulador de conducta: Suministrarlo diariamente. En algunos casos implementar una terapia de ataque la primer semana suministrándolo cada 12 hrs y luego espaciarlo a 24 hrs, durante por lo menos 1 mes, para evaluar resultados. Asociarlo con un programa de modificación del comportamiento.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales menores a 8 semanas o en animales con hipersensibilidad a alguno de los componentes.

EFFECTOS COLATERALES

En algunos casos puede presentarse un grado leve de somnolencia.

RESTRICCIONES DE USO

Si es posible evitar su uso en animales gestantes o en lactancia. Usar con precaución en animales que ya estén en terapia con psicofármacos.