

DOXIMICIN®



Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SOLUCIÓN ORAL

COMPOSICIÓN

Cada mL del producto contiene:
Doxiciclina Hiclato.....11,54 mg
(Equivalente a 10 mg de Doxiciclina base)
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES DE USO

DOXIMICIN® solución oral, es un antibiótico de amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades producidas por agentes susceptibles a la Doxiciclina tales como: *Mycoplasma spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Chlamydomphyla felis*, *Ehrlichia canis*, *Bartonella spp.*, *Porphyromonas spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Pasteurella spp.* y *Bordetella spp.*, entre otras. Su uso está indicado en infecciones del tracto respiratorio (alto y bajo), infecciones bacterianas de la piel, infecciones oculares y peri oculares, Ehrlichiosis canina y Micoplasmosis (Hemobartonelosis) canina y felina.

DOSIS

Dosis del principio activo:

En perros y gatos: 10 mg/Kg.

Dosis del producto:

1 mL por cada Kg de peso, una vez al día por 14 a 21 días. En infecciones del tracto respiratorio, administrar por un máximo de 10 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Administrar por vía oral con jeringa dosificadora. La presentación en solución oral, además de facilitar la administración, evita el riesgo de causar estrechez esofágica en gatos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- La administración simultánea con absorbentes orales, preparaciones con Hierro, antiácidos y en general productos gastrointestinales que contengan cationes de Aluminio, Calcio, Magnesio, Zinc o Bismuto, reduce la biodisponibilidad de Doxiciclina.
- La vida media de Doxiciclina se ve reducida cuando se administra conjuntamente con barbitúricos o Fenitoína.
- Puede existir resistencia cruzada con otras tetraciclinas.
- Doxiciclina no debería usarse conjuntamente con otros antibióticos como β -lactámicos.

CONTRAINDICACIONES

- No usar Doximicin® en animales con hipersensibilidad a la Doxiciclina.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.
- No administrar en animales reproductores.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No exceder la dosis recomendada.
- Administrar con precaución en animales jóvenes.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- No manipular por personas hipersensibles a las tetraciclinas.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar etiqueta del producto.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más comunes son las náuseas y vómitos. Estos efectos son minimizados al administrarse en forma de solución oral. Por su escasa interacción con el Calcio, la Doxiciclina parece menos propensa a producir coloración de los dientes en cachorros.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

INCLUYE dosificador

SOLUCIÓN ORAL

CONSERVACIÓN

Manténgase a temperatura ambiente, entre 15° y 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 60 mL. Incluye jeringa dosificadora y gotario.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Reg. SAG N° 2029-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario