

Flovermic® Raza Grande

Antiparasitario interno de amplio espectro

Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única. Efectivo contra nematodos y cestodos, tales como: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichostrongylus* sp., *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia multiceps*, *Taenia serialis*, *Taenia taeniformis*, *Dipylidium caninum*, *Diphylobothrium latum* y *Echinococcus granulosus*.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Comprimidos.

Acción terapéutica

Antiparasitario interno de amplio espectro.

Composición

Cada comprimido contiene:

Flubendazol.....770 mg

Praziquantel.....175 mg

Pamoato de Pirantel.....504 mg

(Equivalente a 175 mg de Pirantel)

Excipientes c.s.p.....1 comprimido

Indicaciones de uso

Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única. Efectivo contra nematodos y cestodos, tales como: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichostrongylus* sp., *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia multiceps*, *Taenia serialis*, *Taenia taeniformis*, *Dipylidium caninum*, *Diphylobothrium latum* y *Echinococcus granulosus*.

Especie de destino

Perros de gran tamaño (35 Kg)

Vía de administración y modo de empleo

Vía oral, directamente en la cavidad bucal o mezclada en el alimento.

Dosis

- Dosis de los principios activos:
 - Flubendazol: 22 mg/Kg de peso, en dosis única.
 - Pirantel: 5 mg/Kg de peso, en dosis única.
 - Praziquantel: 5 mg/Kg de peso, en dosis única.
- Dosis del producto:

1 comprimido cada 35 Kg de peso en dosis única. Para el tratamiento de infestaciones por *Trichuris vulpis*, administrar 1 comprimido cada 24 horas, por 3 días consecutivos.

Contraindicaciones

- No administrar a perros menores de 4 semanas de edad.
 - No administrar a hembras en gestación o lactancia.
-

Efectos no deseados

Los efectos adversos son raramente observados y si ocurren son leves y transitorios, pudiéndose observar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal y diarrea.

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

Advertencias

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C, protegido de la luz.

Condiciones de venta

Venta bajo receta Médico Veterinario.

Observaciones

PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA
USO VETERINARIO

Registros

Chile: Reg. SAG No: 1390

Perú: Reg. SENASA F.08.21.I.1058

Importado y distribuido por Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Bolivia: Reg. SENASAG PUV- No 10003/21

Importado y distribuido por:

ZOO PHARMA INSUMOS VETERINARIOS S.R.L.

Díaz Romero N° 1339 Zona Miraflores, La Paz-Bolivia

Teléfono: 591 2223357

Costa Rica: Reg. N° MV-7349

Presentación

Pote con 20 comprimidos.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
