

Doximicin® Comprimidos

Antimicrobiano de amplio espectro

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades producidas por agentes susceptibles a la Doxiciclina tales como: infecciones del tracto respiratorio (alto y bajo) causadas por *Mycoplasma* spp., *Chlamydia* spp., *Bordetella* spp., *Haemophilus* spp., *Actinomyces* spp. y *Pasteurella multocida*; infecciones de la piel causadas por *Streptococcus* spp. y *Staphylococcus* spp., infecciones oculares y peri oculares causadas por *Chlamydia* spp.; Ehrlichiosis canina causada por *Ehrlichia canis* y Anemia infecciosa felina y canina, causada por *Haemobartonella felis* y *Haemobartonella canis*, respectivamente.



Ficha Técnica

Forma farmacéutica

Comprimido oral.

Acción terapéutica

Antimicrobiano de amplio espectro.

Composición

Cada comprimido oral contiene:

Doxiciclina Hiclate.....100 mg

(Equivalentes a 86,6 mg de Doxiciclina base anhidra)

Excipientes c.s.p..... 1 comprimido

Indicaciones de uso

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de enfermedades producidas por agentes susceptibles a la Doxiciclina tales como: infecciones del tracto respiratorio (alto y bajo) causadas por *Mycoplasma* spp., *Chlamydia* spp., *Bordetella* spp., *Haemophilus* spp., *Actinomyces* spp. y *Pasteurella multocida*; infecciones de la piel causadas por *Streptococcus* spp. y *Staphylococcus* spp., infecciones oculares y peri oculares causadas por *Chlamydia* spp.; Ehrlichiosis canina causada por *Ehrlichia canis* y Anemia infecciosa felina y canina, causada por *Haemobartonella felis* y *Haemobartonella canis*, respectivamente.

Especies de destino

Perros y gatos.

Vía de administración

Oral

Dosis

- Dosis del principio activo:
10 mg de Doxiciclina/Kg de peso, cada 24 horas por 14 a 21 días. En infecciones del tracto respiratorio, administrar por un máximo de 10 días.
- Dosis del producto:
Administrar 1 comprimido por cada 10 Kg de peso, cada 24 horas por 14 a 21 días. En infecciones del tracto respiratorio, administrar por un máximo de 10 días.
Puede administrarse junto con el alimento.

Efectos adversos y reacciones adversas

Los efectos colaterales más comunes de la doxiciclina administrada vía oral son las náuseas y vómitos.

Advertencias y precauciones especiales de uso

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
 - No exceder las dosis recomendadas.
 - Para Costa Rica: Este producto puede producir resistencia a los antimicrobianos.
-

Interacciones

- La administración simultánea de absorbentes orales, preparaciones con Hierro, antiácidos y en general productos gastrointestinales que contengan cationes de Aluminio, Calcio, Magnesio, Zinc o Bismuto reduce la biodisponibilidad de Doxiciclina.
 - La vida media de Doxiciclina se ve reducida cuando se administra conjuntamente con barbitúricos o Fenitoína.
 - Puede existir resistencia cruzada con otras tetraciclinas.
 - Doxiciclina no debería usarse conjuntamente con otros antibióticos como β -lactámicos.
-

Contraindicaciones

- No administrar a animales hipersensibles a tetraciclinas como por ejemplo Doxiciclina.
 - No administrar a animales con problemas de disfagia o que presenten vómitos.
 - No administrar durante la preñez, lactancia, ni en animales reproductores.
 - No administrar a cachorros menores a 7 – 8 semanas de edad.
-

Precauciones especiales para el operador

- No manipular por personas hipersensibles a Doxiciclina.
 - Lavarse las manos con abundante agua inmediatamente después de manipular el producto.
 - En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar el inserto del producto.
-

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente a menos de 30 °C. No refrigerar ni congelar.

Condiciones de venta

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

Registros

Chile: Reg. SAG N° 1320-B

Costa Rica: Reg. N° MV-5869

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F N° 007261/16

Observaciones

USO VETERINARIO
PROHIBIDA SU VENTA FRACCIONADA

Presentación

Estuche con 10 comprimidos.

Elaborado y distribuido por

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
